

Annexe 1 : Tableau synoptique des recommandations de vaccination pour l'automne 2022

Vue d'ensemble des recommandations de vaccination à l'automne 2022 pour les personnes de ≥ 16 ans déjà vaccinées

Groupe cible	Statut vaccinal	Nombre de doses de vaccin selon recommandations pour l'automne 2022 ¹	Vaccins ²	
			Nom	Dosage
Personnes vulnérables (PV : personnes avec des maladies chroniques, ≥ 65 ans, trisomie 21, femmes enceintes) à partir de 16 ans	Vacciné ³	1 Degré de recommandation : +++	Spikevax Bivalent Original/Omicron ²	50 µg
			Nuvaxovid ^{® 2, 4}	5 µg
			Comirnaty [®]	30 µg
			Spikevax [®]	50 µg
Personnel de santé de ≥ 16 ans, personnes assurant la prise en charge de PV	Vacciné	1 Degré de recommandation : ++	Spikevax Bivalent Original/Omicron ²	50 µg
			Nuvaxovid ^{® 2, 4}	5 µg
			Comirnaty [®]	30 µg
			Spikevax [®]	50 µg
Population générale de 16 à 64 ans	Vacciné	1 Degré de recommandation : (+)	Spikevax Bivalent Original/Omicron ²	50 µg
			Nuvaxovid ^{® 2, 4}	5 µg
			Comirnaty [®]	30 µg
			Spikevax [®]	50 µg

Vue d'ensemble des recommandations de vaccination à l'automne 2022 pour les personnes de ≥ 16 ans pas encore vaccinées

Groupe cible	Statut vaccinal	Nombre de doses de vaccin selon recommandations pour l'automne 2022 ¹	Vaccins	
			Nom	Dosage
PV (personnes avec des maladies chroniques, ≥ 65 ans, trisomie 21, femmes enceintes) à partir de 16 ans	Non vacciné	2 avec un intervalle min. de 4 semaines	Comirnaty [®]	2x 30 µg
			Nuvaxovid ^{® 4}	2x 5 µg
			Spikevax ^{® 5}	2x 100 µg
			Spikevax Bivalent Original/Omicron ⁶	2x 100 µg
Population générale de 16 à 64 ans Y c. personnel de santé de ≥ 16 ans, personnes assurant la prise en charge de PV	Non vacciné	1	Spikevax Bivalent Original/Omicron	50 µg
			Nuvaxovid ^{® 4}	5 µg
			Comirnaty [®]	30 µg
			Spikevax [®]	50 µg
	Non vacciné	<i>Autre possibilité</i> : 2 avec un intervalle min. de 4 semaines	Comirnaty [®]	2 x 30 µg
			Nuvaxovid ^{® 4}	2 x 5 µg
			Spikevax ^{® 5}	2 x 100 µg
			Spikevax Bivalent Original/Omicron ⁶	2 x 100 µg

¹ Dans tous les cas, il convient de respecter, pour la vaccination de rappel à l'automne 2022, un **intervalle minimal de 4 mois** après l'administration de la dernière dose de vaccin ou après l'infection.

² Pour la vaccination de rappel à l'automne 2022 (chez les personnes de ≥ 16 ans qui sont déjà vaccinées) et en fonction de la disponibilité, il est recommandé de privilégier un vaccin à ARNm bivalent ou le Nuvaxovid[®]. Ces vaccins, de même que les vaccins à ARNm monovalents, sont appropriés et recommandés afin d'éviter des infections graves.

³ La recommandation pour une vaccination à l'automne 2022 concerne aussi les personnes qui ont déjà renouvelé la vaccination de rappel.

⁴ La vaccination avec le Nuvaxovid[®] des femmes enceintes ou qui allaitent n'est pas recommandée pour le moment en raison de l'insuffisance de données relatives à la sécurité.

⁵ Si un vaccin à ARNm est administré, il convient de privilégier le Comirnaty[®] pour les personnes de < 30 ans (raison : fort dosage de Spikevax[®]).

⁶ Le Spikevax Bivalent Original/Omicron peut être utilisé uniquement si aucun vaccin monovalent n'est disponible. Il n'existe pratiquement pas de données à ce sujet et il s'agit d'une utilisation hors étiquette (ou *off-label*).



Recommandations spécifiques : enfants et adolescents de 5 à 15 ans

Groupe cible	Statut vaccinal	Nombre de doses de vaccin selon recommandations pour l'automne 2022 ⁷	Vaccins	
			Nom	Dosage
Adolescents 12-15 ans	Vacciné	Pas de vaccination	-	-
	Non vacciné	Pas de vaccination	-	-
		Autre possibilité : 2 avec un intervalle min. de 4 semaines	Comirnaty ^{®9}	2 x 30 µg
Enfants 5-11 ans	Vacciné	Pas de vaccination	-	-
	Non vacciné	Pas de vaccination	-	-
		Autre possibilité : 2 avec un intervalle min. de 4 semaines	Comirnaty ^{®8}	2 x 10 µg
Adolescents 12-15 ans avec des maladies chroniques	Vacciné	Pas de vaccination	-	-
	Non vacciné	1	Comirnaty ^{®9}	30 µg
		Autre possibilité : 2 avec un intervalle min. de 4 semaines	Comirnaty ^{®9}	2 x 30 µg
Enfants 5-11 ans avec des maladies chroniques	Vacciné	Pas de vaccination	-	-
	Non vacciné	1	Comirnaty ^{®8}	10 µg
		Autre possibilité : 2 avec un intervalle min. de 4 semaines	Comirnaty ^{®8}	2 x 10 µg

Recommandations spécifiques : personnes présentant une immunodéficience sévère

Groupe cible	Statut vaccinal	Nombre de doses de vaccin selon recommandations pour l'automne 2022 ⁷	Vaccins	
			Nom	Dosage
Personnes de ≥12 ans présentant une immunodéficience sévère	Vacciné ³	1	Comirnaty [®]	30 µg
			Spikevax ^{®10}	100 µg
			Spikevax Bivalent Original/Omicron ¹⁰	100 µg ¹¹
	Non vacciné	3 + 1	Comirnaty [®]	30 µg (par dose)
			Spikevax ^{®10}	100 µg (par dose)
Spikevax Bivalent Original/Omicron ¹⁰			100 µg (par dose) ¹¹	
Enfants 5-11 ans présentant une immunodéficience sévère	Vacciné	Pas de vaccination	-	-
	Non vacciné	2 + sérologie. En l'absence d'anticorps, 3 ^e dose pour la primovaccination	Comirnaty ^{®8}	10 µg (par dose)

⁷ Dans tous les cas, il convient de respecter, pour la vaccination de rappel à l'automne 2022, un intervalle minimal de 4 mois après l'administration de la dernière dose de vaccin ou après l'infection.

⁸ Aucune recommandation concernant l'utilisation de Spikevax chez les enfants de 5 à 11 ans n'a été formulée car les données disponibles sur l'efficacité et la sécurité pour ce vaccin dans ce groupe d'âge sont limitées.

⁹ Si un vaccin à ARNm est administré, il est recommandé de privilégier le Comirnaty[®] pour la vaccination de toutes les personnes de <16 ans.

¹⁰ Dans ce cas, il convient de privilégier le Comirnaty[®] pour les personnes de < 30 ans (raison : fort dosage de Spikevax[®]).

¹¹ Le Spikevax Bivalent Original/Omicron peut être utilisé uniquement si aucun vaccin monovalent n'est disponible. Il n'existe pratiquement pas de données à ce sujet et il s'agit d'une utilisation hors étiquette (ou *off-label*).

